

VERTISSEMENTS **GRICOLES** téléimprimés EDITION GRANDES CULTURES



STATION
POITOU-CHARENTES

Bulletin n° 301 (21/95) 26/09/1995

COLZA : - Début du vol des grosses altises
- Situation Phoma

REUNION REGIONALE : Retenez dès maintenant votre 28 novembre à NORON (79)

COLZA : stade B2 à B8.

INSECTES

Situation

Petites Altises

Des piqûres de petites altises sont observables sur de nombreuses parcelles. Seul le dégât direct des adultes est à prendre en compte, les pontes étant déposées sur culture de printemps. Pour qu'un traitement soit justifié ; il faut une **grosse pression des insectes à des stades jeunes, cotylédons à une feuille (cas très rares).**

Grosses Altises

Le vol a débuté les 22 et 23 septembre. Les captures sont faibles pour le moment.

Tenthredes de la rave

Les captures d'adultes en cuvettes jaunes sont en diminution.

Pucerons

Pas de capture à la tour à succion de Biard.
Pas d'ailés dans les parcelles.

Préconisation

Les traitements petites altises sont maintenant injustifiés en toute situation. Prévoyez votre traitement grosse altise autour du 15 octobre.

Surveillez les tenthrèdes, intervenir sur les larves dès les premiers dégâts.

MALADIES (Phoma)

Situation

Les périthèces du champignon n'ont pas encore atteint leur maturité. Les captures de spores n'ont pas débuté. Les macules sur feuilles sont toujours absentes.

Préconisation

Il est trop tôt pour envisager une intervention qui ne devra pas être généralisée mais décidée en fonction du niveau de risque parcellaire et du potentiel infectieux (projections).

Ces éléments seront précisés dans les prochains bulletins.



Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX
13, Rte de la forêt B.P. 500 BIARD
Abonnement annuel: 350 F. Tél.: 49.58.39.02

Publication périodique

CPPAP no. 1664 A.D.
ISSN 0294 - 4693

13405 40835

725

TOUTES CULTURES

CAMPAGNOLS

Situation

Des piégeages et notations visuelles effectués du 12 au 20/09/1995 sur 5 secteurs sensibles font apparaître une

remontée importante et dangereuse des populations notamment dans les bordures de route (bermes).

Résultats des piégeages du 12 au 14/09/1995

	Densité/ha		I.R. en %	
	En prairies	En refuges	Mâle	Femelle
Villiers/Echiré	160	310	30,5	38,6
Aiffres/Beauvoir	115	300	29	26

(1) Refuges : bordures de route, chaumes

(2) I.R. : Indice de reproduction :

Femelle : % de femelles allaitantes et/ou gestantes

Mâle : % de mâles actifs.

Notations visuelles

Les 19 et 21/09/95, 33 observations sont effectuées par parcelle sur 100 m de longueur (méthode des fécès).

Secteurs (Nombre parcelles)	Nombre de parcelles selon le niveau d'infestation			Observations
	Faible	Moyen	Fort	
Rom Lezay Chaunay (20)	4	11	5	Fortes populations en général
Vouharte St Amand de Boixe (9)	7	2		Activité moyenne (foyers)
Ruffec (7)	3	1	3	Fortes populations (surtout dans les berms)

Les parcelles observées comprennent en nombre sensiblement égal, d'une part des prairies et des jachères, et d'autre part des refuges.

Niveau d'infestation

- Fort : foyers très rapprochés (un peu plus des 2/3 de la surface).

- Moyen : entre 1/3 et 2/3 de la surface.

- Faible : < 1/3 de la surface.

Préconisation

Traiter les berms infestées dès maintenant ainsi que les prairies et jachères fortement colonisées.